



麥科林醫學診斷中心
MTI Medical Diagnostic Centre

幽門螺桿菌吹氣測試 (藥物服用注意事項)

測試前需停止服用藥物		
測試前30天停止	測試前14天停止	測試前1天停止
Antibiotics 抗生素	Proton pump inhibitors (PPIs) Omeprazole, Lansoprazole, Pantoprazole, Esomeprazole and Rabeprazole etc.	H₂ receptor blockers Cimetidine, Ranitidine, Famotidine etc.
	Potassium-Competitive Acid Blockers (P-CABs) Vonoprazan	
	Bismuth-containing compounds Pepto-Bismol	

訂購/收樣本熱線電話 : 5363 4540

本資料只供參考之用，並非用作代替專業醫護人員意見，診斷或治療方案。如有特別病情，請向你的醫生查詢。



麥科林醫學診斷中心
MTI Medical Diagnostic Centre

幽門螺桿菌吹氣測試 (測試步驟)

碳-13 呼氣測試步驟

1. 空腹呼氣(禁食禁水最少 2 小時)，從口腔呼出氣體樣到淺藍色袋內
2. 用80-100mL溫水送服一粒碳 13 尿素丸(C-13)
3. 靜坐 20 - 30 分鐘
4. 再次呼氣至粉紅色氣袋內，測試完成

注意事項

1. 試驗前30天，不可服用任何抗生素 antibiotics
2. 測試前14天，不可服用任何質子泵抑制劑 Proton Pump Inhibitors
3. 測試前1天，不可服用任何H₂受體拮抗劑 H₂ receptor blockers
4. 在測試前2小時，不吃或喝任何東西。
5. 呼氣樣本在氣袋內，可貯存 10 天。

訂購/收樣本熱線電話 : 5363 4540

本資料只供參考之用，並非用作代替專業醫護人員意見，診斷或治療方案。如有特別病情，請向你的醫生查詢。